



Clinique de Greffe de cheveux Bédard

INSTRUCTIONS PRE OPERATOIRES à une greffe capillaire

2 semaines avant	AUCUNE vaccination.
15 jours avant	Pas d'anti-inflammatoire, PAS d'aspirine.(voir liste)
7 jours avant	Pas de vitamine E (comprimés), de marijuana ni autres drogues.
48 heures avant	Pas d'alcool.
La veille	Laver les cheveux (ou le matin même).

Le jour même :

Vêtements	Nous recommandons chandail ample ou chemise, casquette ajustable, béret ou tuque si désiré. Pas de vêtements ajustés (chandail ou col roulé). Pas de chapeau ou casquette ajusté.
Alimentation	Se nourrir normalement avant de vous présenter à la Clinique. Ne venez pas à jeun. Éviter toutes nourritures grasses.
Prothèse	Si vous avez l'intention de porter votre prothèse après l'intervention, discutez avec votre prothésiste du mode de contention. Tout adhésif dans la région donneuse ou receveuse est défendu. Nous recommandons les attaches du type « barette » qui devront être installées avant l'intervention.
Voiture	Vous devez être accompagné et ne pourrez pas conduire votre véhicule le jour de l'intervention.

Le jour de la chirurgie, vous aurez un consentement à signer dont vous trouverez exemple ci-dessous :



Clinique de Greffe de cheveux Bédard

CONSENTEMENT
aux examens, traitements et interventions

(VOTRE NOM)

J'autorise le **(NOM DU CHIRURGIEN)** à pratiquer une greffe capillaire.

La nature de cet acte, les résultats escomptés, les risques qu'il comporte ainsi que les limitations m'ont été expliqués. Je suis satisfait(e) des explications reçues et je les ai bien comprises.

Je suis bien conscient(e) que la pratique de la médecine et de la chirurgie n'est pas une science exacte et que, par conséquent, les résultats de ce type de chirurgie ne peuvent être garantis.

Date : _____

Signature : _____

Témoin : _____

Clinique de Greffe de cheveux Bédard

Médicaments A EVITER 15 jours avant une chirurgie.

Acethopen	Dristan	Norwich
Alka-Seltzer	Easpirin	Ornex
A.P.O. – A.S.A.	Ecotrin	P-A-C
Arthralgen	Edrisal	Pabalate
A.S.A.	Empiral	Pepto-Bismol
A.S.A. composé	Empirin	Percodan
Asasantine	Endodan	Persistin
Asaphen	Entrophen	Phenacetin
Ascriptin	217, 222, 282 –Mep	Phenaphen
Aspergum	292, 283, 293, 294	Plavix
Aspirin	Equagesic	Proposyphene
Aspirin pour enfants	Excedrin	Robaxisal
Bayer Aspirin	Fiorinal	Roxiprin
BC poudre	Fiortal	Salflex
Buff-A comp.	Gelpirin	Salt-Adult
Bufferin	Goody's	Salt-Infant
Butabital	Halfprin	Sigmagen
Butazolidin *	Indocid	Sine-Off
Carisoprodol	Instantine	Soma préparation
Cordex	Lortab	Synalogs-DC
Coricidin	Magsal	Talwin composé
Coriphen-Codéine	Methocarbamol	Tetrex A.P.C.
Daprisal	Midol	Trigesic
Darvon composé *	Mobigesic	Trilisate
Darvon w/A.S.A.	Mono-gesic	Vanquish
Decagesic	Norgesic	YSP
Disalcid	Novasen	Zacatrin composé-10
Doan	Novahistine w/APC	

Anti-inflammatoires :

Advil	Feldene	Naprelan
Aleve	Haltran	Naprosyn
Anaprox	Ibuprofen	Nuprin
Arthrotec	Indocid	Orudis KT
Cataflam	Lodine	Pediacare
Clinoril	Midol	Sine-Aid IB
Daypro	Motrin	
Dolobid	Nalfon	
Duract		

Tous les décongestionnants

Gualacolate Glycerol : Présent dans un grand nombre de sirops contre la toux; il peut contribuer à faciliter les saignements

* Pas de dérivés d'aspirine, mais contribuent à augmenter les saignements.

Clinique de Greffe de cheveux Bédard

Produits naturels et autres A EVITER 7 jours avant la chirurgie

Peut augmenter les saignements:

Ail	Jus de pamplemousse
Camomille	Patch de nicotine
Gingembre	Poivre de cayenne
Gingko biloba	Selenium
Ginseng	Vitamine E
Echinacée	

Peut intensifier les effets de l'anesthésie:

St-John's wort
Yohimbe
Melatonin